


CASE REPORT



Dr. Paolo Piccoli
docpaolopiccoli@gmail.com

GTR PERIOPLASTICA

Il trattamento della recessione dei tessuti molli può essere indicato per fini di plastica estetica come pure per recuperare livelli di attacco persi per cause diverse. In questi casi l'obiettivo della copertura radicolare dovuto ad una recessione gengivale localizzata deve essere associato ad una terapia che permetta possibilmente di ottenere nuovo legamento e nuovo osso. La membrana GUIDOR[®] Matrix Barrier vanta caratteristiche uniche tra cui la presenza di spaziatori che la distanziano dalla superficie radicolare e permettono la rigenerazione del legamento parodontale secondo i principi della GTR. L'impiego di *device* specifici, quali la membrana GUIDOR[®] Matrix Barrier, consente, come nel caso illustrato, di coniugare una chirurgia plastica parodontale con la *restitutio ad integrum* dei tessuti superficiali e profondi.



Fig. 1 - 19/09/2016 grave recessione dell'elemento 1.3 in soggetto maschio aa.37. Si evidenzia la Cej. Papille ben rappresentate.



Fig. 2 - Sollevamento del lembo a tutto spessore, root planning e disepitelizzazione delle papille prossimali.



Fig. 3 - Applicazione di matrice GUIDOR[®] PPS-R 2mm al di sopra della Cej



Fig. 4 - Sutura a punti staccati. Si prescrive Gel Clorexidina 1% x 2 die



Fig. 5 - Controllo 15gg al momento della rimozione suture. Aspetto ipertrofico-iperplastico della mucosa propria con piccola esposizione della matrice al centro. Continua Gel, no spazzolamento.



Fig. 6 - Controllo a 6 settimane dall'intervento. Si nota ulteriore esposizione della matrice c.a 1mm. Continua Gel, no spazzolamento.



Fig. 7 - controllo a 12 settimane dall'intervento. Dissoluzione della porzione esposta della matrice GUIDOR[®]. Continua Gel e spazzolamento delicato



Fig. 8 - controllo a 6 mesi. Si nota progressivo guadagno coronale del tessuto e pigmentazione residuale all'applicazione del Gel di Clorexidina 1%




Fig. 9 - 13/10/2017 controllo a 1 anno dall'intervento. Si nota completa copertura della radice esposta con livellamento alla Cej della mucosa marginale al confronto con foto 1.